


Masivní zevní krvácení



Zástava masivního zevního krvácení



- **Z rány vystřikuje nebo intenzivně vytéká velké množství krve.**
- **Velká krevní ztráta vede k rozvoji šoku či zástavě oběhu v důsledku vykrvácení.**
- **Chraň se před cizí krví!**
- **Zraněného posad'.**
- **Najdi zdroj krvácení a tlač tam, kde to teče!**
- **Volej záchranku!**

Tlakový obvaz

- Použijeme v případě, pokud potřebujeme pacienta opustit.
- Prosakuje-li tlakový obvaz, aplikujeme další tlakovou vrstvu. Tento postup opakujeme maximálně 2x.
- Neustává-li krvácení, použijeme zaškrcovadlo.



Zaškrcovadlo – zásady pro použití

- **Umístění** – paže, stehno.
- **Řádně zaškrtit** – nedostatečné utažení může krvácení zhoršit!
- **Nepovolovat!**
- **Zaznamenat čas!**
- Po zastavení krvácení zaškrcovadlem je vhodné ránu krýt obvazem.
- **Pozor!** Po každé manipulaci se zraněným, který má přiloženo zaškrcovadlo, proveďte kontrolu utažení.



BEZ RUKY 6
BEZ PRSTU I 24
HODIN !!

První pomoc při amputaci

1. Přivolat ZZS

2. Zastavení krvácení

A. vysoké amputace - přiložení zaškrcovadla

B. nízké amputace - tlakový obvaz

3. Ošetření amputátu:

A: sterilně zabalit

B: vložit amputát do sáčku

C: sáček s amputátem vložit do sáčku se studenou vodou (dle možností)




! Nikdy nekládejte amputát přímo na led nebo do vody !

BEZ RUKY 6
BEZ PRSTU 1 24
HODIN !!

Ošetření amputátu

zajištění amputované
části těla



BEZ RUKY 6
BEZ PRSTU I 24
HODIN !!

Zapamatujte si !

Oddělenou část těla nedesinfikovat, vložit do sáčku a ten do dalšího s 1/3 ledu a 2/3 vody!

NEPOKLÁDAT, ZAVĚSIT !!!!!!!!!!!!!

ÚSPĚŠNOST:

prsty – i za 24 hod,

ruka – cca 6 hodin (jen při 4 °C)

Použitá literatura

- KOLEKTIV AUTORŮ. *Standardy první pomoci*. Praha : Český červený kříž, 2017
- KOLEKTIV AUTORŮ. *Neodkladná zdravotnická pomoc*. Praha: MV GŘ HZS, 2018
- www.zdrsem.cz

Kvalitní praktické školení první pomoci nelze nahradit teoretickou výukou. Domluvte si účast na námi pořádaném kurzu.

www.spolekspj.cz

